


Lưu ý tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc loãng xương

Written by Administrator

Wednesday, 30 November 2011 13:50 -

Alendronat là thuốc có tác dụng ức chế tiêu xương đặc hiệu. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, thuốc tích tụ chọn lọc các vị trí tiêu xương đang hoạt động, alendronat có tác dụng ức chế sự hoạt động của các hủy cốt bào. Khi dùng thuốc loãng xương alendronat có thể làm tăng đáng kể khối lượng xương xốp xương cốt sống, xương đùi và mật độ chuyển. Ở phụ nữ mãn kinh từ 40 trở lên bị loãng xương (đặc biệt xác định là có khối lượng xương thấp, ít nhất là 2 lần lệch chuẩn dưới trung bình của thời kỳ trước mãn kinh), dùng thuốc alendronat làm giảm đáng kể số lần gãy đốt sống sau 3 năm dùng thuốc. Mật độ chất khoáng xương tăng rõ sau 3 tháng dùng thuốc alendronat và còn tiếp tục trong suốt quá trình dùng thuốc. Tuy nhiên sau 1 - 2 năm dùng thuốc, nếu ngừng ngay liệu pháp alendronat thì không duy trì được sự tăng khối lượng xương.

Thuốc đặc biệt sử dụng để điều trị và dự phòng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh, phụ nữ có nguy cơ mắc loãng xương hoặc cho người mong muốn duy trì khối lượng xương và giảm nguy cơ gãy xương sau này. Thuốc còn dùng để phòng và điều trị loãng xương do dùng corticosteroid...



Mặc dù trong các nghiên cứu lâm sàng, các phụ nữ có hội chứng do dùng thuốc loãng xương nhẹ và nói chung không cần phải ngừng thuốc. Tuy nhiên, cần chú ý về những tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa của thuốc.

Đã có báo cáo về các biến chứng thực quản như viêm thực quản, loét thực quản, trợt thực quản, đôi khi kèm với chảy máu nặng nề ở bệnh đang điều trị bằng thuốc này. Trong một số trường hợp hiếm, những biến chứng này bệnh nhân gặp phải nghiêm trọng. Vì vậy, trong quá trình dùng thuốc này nếu thấy

Lưu ý tác dụng không mong muốn khi đi u trừ loãng xương

Written by Administrator

Wednesday, 30 November 2011 13:50 -

Có triệu chứng khó nuốt, nuốt đau hoặc đau xương... , ngừng i bệnh phải ngừng thuốc và gặp thầy thuốc ngay để xử trí kịp thời. Nguy cơ mất cân bằng điện giải và/ hoặc không nuốt viên thuốc với một số bệnh ngừng i bệnh nghiêm trọng ngay sau khi uống thuốc và/ hoặc không nuốt viên thuốc với một số bệnh nặng và/ hoặc viêm tiêu hóa ở người uống thuốc này sau khi đã thấy những triệu chứng kích thích tiêu hóa.

Thuốc có thể kích thích niêm mạc đường tiêu hóa trên và khả năng làm cho bệnh xấu đi. Cần thận trọng khi dùng thuốc ở người bệnh có bệnh lý đang hoạt động về đường tiêu hóa như các bệnh tiêu hóa, viêm dạ dày, viêm tá tràng hoặc loét...

Đưa thuốc đúng hướng thụ phải uống thuốc với nhiều nước (khoảng 200ml), không dùng nước khoáng để uống thuốc. Uống thuốc ít nhất 30 phút trước khi ăn, uống hoặc dùng thuốc khác. Ngay khi có uống thuốc với nước cam hoặc cà phê thì sẽ hấp thụ của thuốc cũng đã giảm rõ rệt. Không ngậm hoặc nhai viên nén khi uống và ngừng i bệnh tránh nằm trong ít nhất 30 phút sau khi uống thuốc để thuốc vào dạ dày dễ dàng và giảm thiểu năng kích thích tiêu hóa. Không nên uống thuốc vào lúc đi ngủ hoặc trước khi đi ngủ trong ngày. Cần bổ sung calci và vitamin D nếu uống hàng ngày trong khi uống không đủ.

DS. Hoàng Thu Thủy

[tính](#) [Ads by NhutCorp](#) [Thi t k website](#) [Thi t k website](#) [Th thu t máy](#)
[bá web](#) [Qu ng](#)