

## Tác dụng phụ của thuốc trị viêm gan C mãn tính

Written by Administrator

Monday, 26 December 2011 16:45 -


---

Tôi 57 tuổi, mắc bệnh viêm gan C mãn tính. Tôi rất lo lắng và không biết hiện nay có thuốc gì để điều trị bệnh này không? Xin quý báo giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn!

Nguyễn Hòa Bé (Bình Ninh)

Các bệnh nhân nhiễm virus viêm gan C mãn tính, mục tiêu điều trị là diệt trừ virus, ức chế virus sao chép lâu dài và giảm tình trạng viêm gan. Điều trị viêm gan C mãn tính đã có nhiều tiến bộ trong nhiều năm qua, các thuốc hiện đang được sử dụng là:

- Peg - interferon, là sự phối hợp giữa interferon với polyethylen glycol, còn gọi là pegylate hóa, làm chậm độ thanh thải nên có dùng một tuần một lần. Điều trị phối hợp với ribavirin cho tỷ lệ đáp ứng cao hơn > 50%. Trường hợp bệnh nhân chỉ dùng ribavirin có thể điều trị bằng peg - interferon.



Virut viêm gan C.

Phụ nữ nên các tác dụng ngoại ý là ức chế miễn dịch và trung bình không cần hạn chế điều trị. Các

## Tác dụng phụ của thuốc trị viêm gan C mạn tính

Written by Administrator

Monday, 26 December 2011 16:45 -

---

tác dụng phụ hay gặp là đau nhức, mệt, chán ăn, sốt, đau khớp, triệu chứng giống cúm, trầm cảm... ngoài ra có thể gặp giảm bạch cầu trung tính, thiếu máu, phát ban, tăng creatin máu, nhìn mờ, mất ngủ, rong kinh, táo bón, rối loạn tâm thần...

- Ribavirin là một chất tổng hợp guanosine có phổ hoạt tính rộng chống lại các virus RNA và DNA gồm các Flaviviridae như virus viêm gan C. Ribavirin có vai trò quan trọng trong phác đồ phối hợp với peg - interferon trong suốt quá trình điều trị.

Ribavirin có tác dụng làm tăng đáp ứng cytokin interleukin 1 và đáp ứng tăng sinh tế bào T gây độc tế bào. Ribavirin có thời gian bán thải 44 - 49 giờ sau liều duy nhất và sẽ tăng cao sau khi dùng lâu dài, bệnh thận, sẽ thanh thải ribavirin cần chú ý tu chỉnh sau khi ngừng thuốc. Thanh thải ribavirin giảm nếu bệnh nhân suy thận nên không dùng bệnh nhân có mức thành thải creatinin < 50ml/phút.

Các tác dụng phụ hay gặp là gây tan máu, ngoài ra còn gây quái thai, do đó không được dùng cho phụ nữ mang thai.

Lưu ý: Các bệnh nhân viêm gan C mạn tính mà mắc thêm bệnh xơ gan mất bù, bệnh tim mạch, rối loạn nhịp tim, bệnh thiếu máu và thiếu máu cục bộ, suy thận, phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi tuyệt đối không được sử dụng các thuốc này. Thuốc chống chỉ định bệnh thận nặng đối với các bệnh nhân thiếu máu 3 dòng, bệnh nhân có các rối loạn tâm thần, các rối loạn co giật.

ThS. Nguyễn Thu Hiền

[Diễn viên rút](#)   [Ads by NhatCorp](#)   [Thiết kế website](#)   [Phụ nữ miễn phí](#)   [Internet](#)   [\\_](#)