


Thuốc trị bệnh viêm niệu đở nam

Written by Administrator

Monday, 26 December 2011 16:45 -

Viêm niệu đở nam có thể có hay không xuất từ từ niệu đở nữ có nghĩa, cảm giác kim châm, tiểu buốt. Viêm niệu đở nam có thể có nhiễm khuẩn hoặc không nhiễm khuẩn.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh M (CDC) và các nước ta đang áp dụng thì thuốc được dùng trong viêm niệu đở nam như sau: Nếu xét nghiệm vi khuẩn (N. Gonorrhoeae, Ch, Tracomatis) cho kết quả dương tính thì dùng azithromycin hoặc dùng doxycyclin phối hợp với cefixim (uống) hoặc tiêm bắp ceftriaxon. Nếu xét nghiệm vi khuẩn cho kết quả âm tính thì hoãn điếu trị. Ngoài ra, nếu xét thấy nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục cao, người bệnh không có khả năng quay lại thì vẫn có thể điếu trị theo phác đồ trên. Do tình hình kháng thuốc cao nay không dùng fluoroquinolon trong điếu trị. Nếu người bệnh thấy dùng fluoroquinon thì cần xét nghiệm lại vi khuẩn xem có thể tái nhiễm hoặc không.



Vi khuẩn

N. Gonorrhoeae - Một thể phẩm gây viêm niệu đở nam

Azithromycin cũng là thuốc được trị với các khuẩn gây viêm niệu đở không do lậu như Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, cho nên dùng phác đồ azithromycin sẽ có hiệu quả nếu nhiễm hai khuẩn này. Tuy nhiên, Mycoplasma genitalium có tính kháng azithromycin cao nên nếu dùng phác đồ này mà vẫn còn nhiễm Mycoplasma genitalium dai dẳng thì kéo dài ngày hoặc thay thế bằng thuốc khác.

Ở những vùng có tỷ lệ nhiễm Trichomonas (trùng roi) cao, vẫn dùng phác đồ này nhưng nên thêm metronidazol hay tinidazol vào phác đồ.

Thuốc trị bệnh viêm niệu đở o nam

Written by Administrator

Monday, 26 December 2011 16:45 -

Có nhđ ng nhiđ m khuđ n niđ u đđ o nam có triđ u chđ ng lâm sàng nhđ ng xét nghiđ m vi khuđ n cho kđ t quđ âm tính, dùng azithromycin thì các triđ u chđ ng do chúng gây ra cũng giđ m tđ i 85%, chđ ng tđ azithromycin có hiđ u lđ c trên các chđ ng này (Theo Maeda S-2009).

Cũng theo mđ t sđ nghiên cđ u mđ i đây cho biđ t: Viêm niđ u đđ o nam do giang mai đđ ngđđ i nhiđ m HIV thì dùng azithromycin cho kđ t quđ 76,8%, tđ đđ ng đđ đđ ng vđ i kđ t quđ tiêm penicillin chđ m 78,5% (theo Journal Watch Infectious Disease May 5,2010). Nhđ vđ y trong trđ đđ ng hđ p này thì viđ c dùng phác đđ azithromycin là có lđ i.

Sau đđ u trđ viêm niđ u đđ o nam 3 tháng, cđ n tái khám, đđ u trđ lđ i theo phác đđ azithromycin dùng trong 5 ngày, hay doxycilin dùng trong 7 ngày kđ t hđ p vđ i metronidazol dùng 1 liđ u duy nhđ t.

Mđ c đđch đđ u trđ viêm niđ u đđ o nam là nhđ m giđ m triđ u chđ ng, nhđ n diđ n và chđ ng các nhiđ m khuđ n, các bđ nh lây truyđ n qua đđ đđ ng tình đđ c, các nhiđ m khuđ n không lđ u, làm giđ m các đđ u kiđ n thuđ n lđ i gây bđ nh lây truyđ n qua đđ đđ ng tình đđ c, kđ cđ HIV. Azithromycin theo trên nhđ mđ t kháng sinh đa năng đđ đđ c các mđ c đđch đđ u trđ này.

[Miđ n phí](#) [Ads by NhutCorp](#) [Internet](#) [Thiđ t kđ website](#) [Email marketing](#) _